

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ BÌNH LƯ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /UBND-KT

Bình Lư, ngày tháng 4 năm 2026

V/v chủ động phòng trừ sâu
bệnh gây hại lúa vụ Đông
xuân, ngô vụ Xuân hè

Kính gửi:

- Phòng Kinh tế;
- Trung tâm Dịch vụ tổng hợp;
- Trưởng bản các bản trên địa bàn xã.

Thực hiện Công văn số 2048/SNNMT-TT&BVTV ngày 06/4/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lai Châu về việc chủ động phòng trừ sâu bệnh gây hại lúa Đông xuân, ngô vụ Xuân hè. UBND xã Bình Lư yêu cầu:

1. Phòng Kinh tế; Trung tâm Dịch vụ tổng hợp

Tăng cường công tác điều tra, giám sát, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại. Phối hợp với Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật kiểm tra, đánh giá tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng, chủ động tham mưu, hướng dẫn các biện pháp phòng trừ kịp thời, hiệu quả.

2. Các Trưởng bản

Phối hợp với cơ quan chuyên môn tuyên truyền Nhân dân thường xuyên thăm đồng và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh gây hại, cụ thể như sau: *(Có hướng dẫn kèm theo)*.

UBND xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan, các Trưởng bản tổ chức triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT: Đảng ủy, HĐND xã (B/c);
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Ủy ban MTTQ VN xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Như Hợp

HƯỚNG DẪN

Các biện pháp phòng trừ một số đối tượng sâu bệnh gây hại

- **Trên cây lúa:** Tập trung giám sát, phòng trừ kịp thời tập đoàn rầy, sâu đục thân, bọ xít, bệnh đạo ôn lá, bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh bạc lá, bệnh đốm sọc vi khuẩn, bệnh khô vằn, chuột.

+ Đối với tập đoàn rầy: Rầy lúa 2 gây hại mạnh từ giữa tháng 4, rầy lúa 3 nở rộ đầu tháng 5 trở đi ở giai đoạn lúa làm đòng - trổ bông - chín sữa. Theo dõi diễn biến phát sinh của rầy trên các trà lúa, tổ chức phòng trừ kịp thời những diện tích có mật độ cao từ khi mới xuất hiện rầy cám tiến hành phun phòng trừ khi mật độ rầy > 750 con/m². Sử dụng các loại thuốc có hoạt chất *Abamectin, Acetamiprid, Phoxim, Chlorfenapyr, Dinotefuran, Imidacloprid, Fenobucarb, Buprofzin...* để phun trừ rầy. Trong trường hợp mật độ rầy cao nên phun 2 lần, cách nhau từ 5 - 7 ngày.

+ Đối với sâu đục thân 2 chấm: Chú ý lúa 2 gây hại mạnh từ giữa tháng 4 đến giữa tháng 5. Sử dụng các loại thuốc có hoạt chất như *Abamectin, Emamectin benzoate, Azadirachtin, Benfuracarb, Alpha-cypermethrin, Profenofos, Carbaryl, Cartap, Cypermethrin, Dimethoate*.

+ Đối với Bọ xít: Sử dụng các loại thuốc có hoạt chất như: *Abamine, Petroleum oil, Alpha-cypermethrin, Cypermethrin, Chlorpyrifos Methyl, Dimethoate*.

+ Đối với bệnh đạo ôn: Phun phòng một số loại thuốc có hoạt chất *Isoprothiolane, Tricyclazole, Fenoxanil, Azoxystrobin, Difenoconazole, Hexaconazole, Ningnanmycin, Tebuconazole, Bemystrobin, Bismertiazol*. đặc biệt trên các giống nhiễm như: Tẻ râu, Sóng cù, J02.... cần phun phòng 2 lần vào giai đoạn khi lúa trổ 5% và sau khi lúa trổ hoàn toàn để hạn chế lây lan lên cổ bông.

+ Đối với bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: Tập trung phòng trừ ngay khi bệnh mới xuất hiện để hạn chế sự lây lan. Sử dụng các thuốc có hoạt chất *Copper citrate, Copper Hydroxide, Copper sulfate, Fosetyl-aluminium, Fungous Proteoglycans, Bismertiazol, Kasugamycin, Oxolinic acid, Streptomycin sulfate, Chlorobromo isocyanuric acid, Copper Oxychloride, Ethylcin, Ningnanmycin*.

+ Đối với chuột: Cần triển khai thực hiện các biện pháp diệt chuột bằng bẫy và sử dụng thuốc diệt chuột sinh học; tuyệt đối không dùng thuốc cấm, thuốc ngoài danh mục, nên sử dụng nhóm thuốc chống đông máu thế hệ mới có hoạt chất *Brodifacoum, Bromadiolone, Diphacinone, Warfarin*,

Cholecalciferol... để diệt chuột, đồng thời thu gom xác chuột đem chôn để tránh gây ô nhiễm môi trường.

- **Trên cây ngô:** Tập trung giám sát sớm sâu keo mùa thu, bệnh đốm lá.

+ Sâu keo mùa thu: Thường xuyên điều tra đồng ruộng, hướng dẫn nông dân phát cỏ dại xung quanh vùng trồng ngô để hạn chế nơi trú ẩn của sâu, khi mật độ sâu non từ 2-4 con/m² tiến hành phun thuốc phòng trừ, sử dụng thuốc có hoạt chất **Abamectin, Triflumuron, Alpha-cypermethrin, Profenofos, Emamectin benzoate, Indoxacarb, Chlorantraniliprole, Thiamethoxam.**

+ Bệnh đốm lá: Phát sinh mạnh trong điều kiện khí hậu ẩm ướt, bệnh thường phát sinh mạnh ở giai đoạn ngô đã lớn nhất là giai đoạn trỗ cờ trở đi. Sử dụng một số loại thuốc có hoạt chất **Azoxystrobin, Difenoconazole, Chitosan, Cytokinin.**

Lưu ý:

- Phát hiện sâu bệnh và xử lý kịp thời khi sâu tuổi nhỏ, bệnh mới xuất hiện để đạt hiệu quả cao. Ưu tiên sử dụng nhóm thuốc trừ sâu sinh học.

- Phun thuốc vào buổi sáng khi đã tan sương, buổi chiều mát, đảm bảo thời gian sau phun tối thiểu 4 giờ không bị gặp mưa. Trong thời gian xử lý bệnh không bón đạm và phun các loại phân bón lá cho cây lúa.

- Tuân thủ nghiêm thời gian cách ly ghi trên nhãn thuốc, trang bị đầy đủ bảo hộ lao động khi sử dụng thuốc BVTV.

- Việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải tuân thủ đúng theo nguyên tắc “4 đúng”, đảm bảo an toàn cho người, cây trồng và môi trường. Sử dụng thuốc trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng theo quy định hiện hành. Sử dụng luân phiên hoạt chất, không phun lặp lại 1 loại thuốc nhiều lần. Thực hiện thu gom vỏ bao thuốc BVTV sau khi sử dụng đúng quy định.